

陕西卫矛属新分类群

何云核 曲式曾

NEW TAXA OF EUONYMUS LINN. FROM
SHAANXI CHINA

He Yun-he Qu Shi-zeng

〔提要〕 本文报导了产于陕西的卫矛属植物1新种2新变种, 11个新异名。新种新变种是:
Euonymus pashanensis S. Z. Qu et Y. H. He, *E. hamiltonianus* Wall. var.
pubinervius S. Z. Qu et Y. H. He, *E. sanguineus* Loes. var. *lanceolatus* S.
Z. Qu et Y. H. He.

刺果卫矛 (图鉴)*

Euonymus acanthocarpus Franch. Pl. Delav. 2: 129 (1889). — *E. acanthocarpa* Franch. var. *sutchensis* Franch. ex Loes. in Bot. Jahrb. 20: 439 (1900)⁽⁴⁾ — *E. longipes* Lace in Kew Bull. 1915: 396 (1915). — *E. laxa* Wang in Contrib. Bot. Surv. N. W. 1: 12 (1939)⁽³⁾ — *E. acanthocarpa* Franch. var. *longipes* (Lace) Blak. in Kew. Bull. 1951: 273 (1951), syn. nov. — *E. lushanensis* Chen et M. C. Wang in Acta phytotax. Sinica 3: 239 (1954).

秦巴山区习见; 生于海拔1000—2000米的河谷、林下。湖北、四川、贵州、云南、江西、浙江、安徽、湖南、广西均有分布。

据观察, 本种总花梗长度变异幅度大, 常在同一份标本中, 总花梗长度4—9厘米不等, 相差达4—5厘米。从Lace发表的*E. longipes* Lace原始描述看; 除总花梗较长(“4—9.5厘米”)外, 与刺果卫矛没有什么差别, 况且刺果卫矛的总花梗亦较长(5厘米), 仅从总花梗长度上很难分开。二者的分布区亦交错重叠。因此将*E. acanthocarpus* Franch. var. *longipes* (Lace) Blak. (长梗刺果卫矛) 并入正种。

茎皮入药, 可治妇科病及风湿疼痛。

何云核: 安徽, 合肥, 安徽农学院林学系 (Department of Forestry, Anhui Agricultural College, Hefei, Anhui)

曲式曾: 陕西, 杨陵镇, 西北林学院森保系 (Department of Forest protection, Northwestern College of Forestry, Yang Lin Town, Shaanxi)

* 标本引证从略。本文所依据的标本均保存在西北林学院及西北植物研究所标本室。

大果卫矛 (图鉴)

Euonymus myrianthus Hemsl. in Kew Bull. Misc. Inform. 1893: 210 (1893). — *E. rosthornii* Loes. in Bot. Jahrb. 29: 437, t. 4 (1900). — *E. sargentiana* Loes. et Rehd. in Sargent, Pl. Wilson. 1: 487 (1913). (2) — *E. myrianthus* Hemsl. var. *tenuifolius* (Loes.) Blak. in Kew. Bull. 1951: 252 (1951), syn. nov. — *E. myrianthus* Hemsl. var. *crassifolius* (Loes.) Blak. l. c., syn. nov.

秦岭以南 700—2000 米的林中、河谷习见。分布于秦岭以南诸省。

Loesener (1900) 根据四川、南川的标本发表了 *E. rosthornii* Loes. 及其 2 变种 var. *tenuifolius* Loes. 和 var. *crassifolius* Loes.。1951 年 Blaklock 将该种并入大果卫矛中, 但 2 变种仍然保留。Loesener 发表 2 变种时, 谓 var. *tenuifolius* “叶薄革质; 花序梗长 2.5 厘米, 3—4 次分叉; 蒴果轮廓倒心形”。而 var. *Crassifolius* “叶厚革质; 花序梗长 2 厘米, 1—2 次分叉; 蒴果轮廓阔倒卵形”。作者在认真检查了陕西、四川等地的大量标本之后, 认为所谓“薄叶”与“厚叶”者在叶的质地、总花梗长度及分叉、果形等特征上无明显间断, 特征有交错。因此将大果卫矛的 2 变种并入正种。

丝棉木 (陈嵘: 中国树木分类学)

Euonymus bungeanus Maxim. Prim. Fl. Amur. 9: 470 (1859). — *E. mongolicus* Nakai in Pl. Nov. Jehol. 1: 7, t. 2 (1934). — *E. bungeana* Maxim. var. *latifolia* Wang in Chinese Journ. Bot. 1: 45 (1936). — *E. bungeanus* Maxim. var. *mongolicus* (Nakai) Kitagawa in Lineamenta Florae Manchuricae: 308 (1939), syn. nov.

陕北、关中均产; 陕西各地多栽培。辽宁以南、福建以北诸省均有分布。

Kitagawa (1939) 将 *E. mongolicus* Nakai 并入本种, 作为本种的一个变种。该变种与正种区种在于叶较阔, 基部宽楔形至几乎截状。作者仔细检查了陕西、山西、辽宁等地的大量标本并作了野外观察, 发现这种叶多出现在丝棉木的萌发枝上, 常常同一枝上既有基部楔形又有宽楔形至几乎截状的叶, 中间无明显的间断, 故将蒙古丝棉木 *E. bungeanus* Maxim. var. *mongolicus* (Nakai) Kitagawa 并入正种。

果实可作染料; 枝叶入药可治漆疮、膝关节痛、鼻出血, 又可利尿。

毛脉卫矛 新变种 图版: 1—3

Euonymus hamiltonianus Wall. var. *pubinervius* S. Z. Qu et Y. H. He, var. nov.

A typo recedit foliis oblongo-ellipticis vel oblongo-obovatis, nervis subtus papilliformibus pubescentibus. Simul affinis *E. hamiltoniano* Wall. var. *hiansi* (Koehne) Blak. et *E. hamiltoniano* Wall. var. *lanceifolio* (Loes.) Blak., ab illo differt foliis oblongo-ellipticis vel oblongo-obovatis, nervis subtus papilliformibus pubescentibus, reticulatis obsoletis; ab hoc foliis basi latioribus, nervis haud vel paulo furcatis, ideo reticulatis valde obso-

letis.

Shaanxi: Xunyang, alt. 750 m., 20 VII 1958, M. C. Wang 285 (Typus! NWCF), id., alt. 670 m., 29 X 1985, Y. H. He 071, id., alt. 780 m., 28 X 1985, Y. H. He 065, Nanzeng, alt. 860 m., 7 X 1985, Y. H. He 040, id., alt. 800—860 m., 13 V 1986, Y. H. He 115, 116, 117; Lueyang, alt. 1030 m., K. T. Fu 5690, id., 950 m., C. L. Tang 704, 1040; Danfeng, alt. 1200 m., S. B. He 315; Baihe, alt. 870 m., Vegetable group 533.

与正种区别在于叶矩圆状椭圆形或矩圆状倒卵形，下面脉上被乳突状短毛。同时本变种又与 *E. hamiltonianus* Wall. var. *hians* (Koehne) Blak. 及 *E. hamiltonianus* Wall. var. *lanceifolius* (Loes.) Blak. 近缘，与前者区别在于叶矩圆状椭圆形或矩圆状倒卵形，下面脉上被乳突状短毛，网结不明显；与后者区别在于叶基部较阔，叶脉不分叉或稍分叉，因而网结极不明显。

陕西：旬阳、楼房乡，750米，1958. 7. 20日，王明昌 285（模式标本！存西北林学院标本室）；同地，670米，1985. 10. 29日，何云核 071；同地、铜钱乡，780米，1985. 10. 28日，何云核 065；南郑，860米，1985. 10. 7日，何云核 040；同地，800—860米，1986. 5. 13日，何云核 115、116、117；略阳，1030米，傅坤俊 5690；同地，950米，唐昌林 704、1040；丹凤，1200米，何善宝 315；白河，870米，植被组 533。

14. 全缘卫矛

Euonymus integerrimus Prokh. in Bot. Mat. 14: 240 (1951). — *E. verrucosus* Scop. var. *chinensis* Maxim. in Act. Hort. Petrop. 74 (1859), syn. nov. — *E. pauciflorus* Maxim. var. *chinensis* (Maxim.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. 7: 204 (1926), syn. nov.

秦岭南北坡均产，生于1000—2000米的河谷、林下。我国甘肃、青海、宁夏有分布。

本种最初由 Maximowicz (1859) 作为 *E. verrucosus* Scop. 的一个变种 *E. verrucosus* Scop. var. *chinensis* Maxim. 发表，后由 A. Rehder 将其转入 *E. pauciflorus* Maxim. 中。该变种的形态特征同 *E. verrucosus* Scop. 和 *E. pauciflorus* Maxim. 既间断又连续，介于二者之间。该变种叶两面被柔毛，下面更密，花序生小枝较上部叶腋，此与 *E. pauciflorus* Maxim. 相近，但叶极全缘，上面的毛贴伏，叶柄较长，花较多（3—7花），花序中央之花梗明显，且较两侧的长，易于区别；该变种叶多为锐尖，叶柄较长（2—4毫米），又与 *E. verrucosus* Scop. 近缘，但叶全缘，两面被柔毛，花序生小枝较上部叶腋可以区别。再从地理分布看亦和 *E. verrucosus* Scop. 和 *E. pauciflorus* Maxim. 有一定联系，但有明显的间断。该变种分布于陕西、太白山，西至甘肃东部，最西达青海东部（循化），向北只分布到宁夏、六盘山；*E. pauciflorus* Maxim. 分布于东北、朝鲜和西伯利亚；而 *E. verrucosus* Scop. 则分布于欧洲东部、高加索、小亚细亚、波斯北部，与该变种的分布区相距甚远。因此作者认为应将该变种独立为种。鉴于该变种提升为种时，原来的加词不能采用，而 Prokhanov 1951年根据该变种原产地模式发表的新种名 *E. integerrimus* Prokh. 乃为新等级中最早的、合法的可用名称，根据《法规》第60条的规定，应该采用 Prokhanov 的名称。

〈加词〉作为种名。

大花卫矛 (陈嵘: 中国树木分类学)

Euonymus grandiflorus Wall. in Roxb., Fl. Ind. ed. Carey, 2: 404 (1824). — *Lophopetalum grandiflorum* Arnott in Ann. Nat. Hist. 3: 151 (1839). — *Euonymus grandiflorus* Wall. f. *salicifolius* Stapf et Ballard in Curtis's Bot. Mag. 153, t. 9183 (1927), syn. nov. — *E. grandiflorus* Wall. var. *angustifolia* Wang in Chin. Journ. Bot. 1: 49 (1936).

该种在陕西已为分布区北界, 仅见于巴山北坡; 生于 500—2000 米的河谷。分布于甘肃、湖北、湖南、四川、云南、贵州。印度、缅甸北部亦有分布。

本种叶的形状、大小、质地变异很大。一般营养枝、萌发枝上的叶较狭、较小、较薄, 多为倒披针形、倒卵形或椭圆形; 果枝上的叶较宽、较大、较厚, 多为倒卵圆形或卵状椭圆形, 常常同一号标本中会出现多种叶形。因此宜将 *E. grandiflorus* Wall. f. *salicifolius* Stapf et Ballard (柳叶大花卫矛) 并入正种。

入药可代杜仲, 治高血压、腰膝疼痛。

角翅卫矛 (图鉴)

Euonymus cornutus Hemsl. in Kew. Bull. Misc. Inform. 1893: 209 (1893). — *E. quinquecornuta* Comber in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 18: 243 (1934). — *E. cornutus* Hemsl. var. *quinquecornutus* (Comber) Blak. in Kew Bull. 1948: 241 (1948), syn. nov. — *E. cornutus* Hemsl. var. *typicus* Blak. l. c. 240 (1948).

秦巴山区 1000—2000 米的山谷林下习见。四川、云南、贵州、甘肃、河南、湖北、湖南亦有分布。

本种果翅 4—5, 以 5 翅居多。Comber (1934) 将果具 5 翅的一类分出, 建立一种新五角卫矛 *E. quinquecornutus* Comber, , 因为他在发表新种时未看到同一份 (号) 标本中既有 5 翅又有 4 翅的果实, 但曾指出这一性状不稳定。据观察, 本种的果翅数目确实不稳定, 常常同一份标本中 5 翅、4 翅的果实均存。因此将 *E. cornutus* Hemsl. var. *quinquecornutus* (Comber) Blak. 并入正种。

纤齿卫矛 (图鉴) (原变种)

Euonymus giraldii Loes. var. *giraldii* — *E. giraldii* Loes. var. *genuina* Loes. in Bot. Jahrb. 29: 443 (1900). — *E. giraldii* Loes. var. *angustialata* Loes. in Sargent, Pl. Wilson. 1: 495 (1913), syn. nov.

秦巴山区均产; 生 1000—3000 米的山坡丛林。分布于青海、甘肃、宁夏、河南、河北、山西、四川。

从陕西等地的大量标本来看, 果翅均较狭长 (宽不到 6 毫米)、先端较钝, 常常同一号标本中既有狭翅又有稍宽翅的果实。故将狭翅纤齿卫矛 *E. giraldii* Loes. var. *angustialatus* Loes. 并入原变种。

石枣子 (陈嵘: 中国树木分类学) (原变种)

Euonymus sanguineus Loes. var. *sanguineus* — *E. sanguineus* Loes. var.

camptocarya Loes. in Bot. Jahrb. 1. c. 442(1900). — *E. sanguinea* Loes. var. *orthoneura* Loes. 1. c. — *E. sanguinea* var. *laxa* Loes. 1. c. 30:465(1902), syn. nov. — *E. sanguinea* Loes. var. *brevipedunculata* Loes. in Sargent, Pl. Wilson. 1:495(1913), syn. nov.

秦巴山区普遍分布；生1000—3000米的山坡丛林中。分布于甘肃、青海、湖北、四川、云南。

原变种总花梗长4—6厘米。Loes. 仅凭总花梗长度根据陕西户县及四川西部的标本分别发表了2变种 *E. sanguineus* var. *laxus* (疏花石枣子) 和 *E. sanguineus* var. *brevipedunculatus* (短梗石枣子)。据观察，总花梗长度变异很大，从2—9厘米不等，变异幅度达2—4厘米。故总花梗长度不能作为分类的主要依据，应将2变种变入原变种。

披针叶石枣子 新变种 图版：4—7

Euonymus sanguineus Loes. var. *lanceolatus* S. Z. Qu et Y. H. He, var. nov.

A typo differt gemmis magnis 6—10(—15)mm. longis, 3—5 mm. crassis; foliis lanceolatis vel ovato-lanceolatis, angustioribus et longioribus, apice longe acuminatis, nervis utrinsecus 8—12, manifeste anastomosantibus; inflorescentia bis usque ter furcata; capsularum alis 5—10 mm. longis et 9—12 mm. latis.

Shaanxi, Nanzheng, alt. 1200 m., 22 VII 1963, M. C. Wang 689; id., alt. 770 m., 5 VIII 1963, M. C. Wang 728 (Typus! NWCF); id., alt. 1300 m., 8 X 1985, Y. H. He 041, 042, 043, 045, 046; id., alt. 1000—1200 m., 13 V 1986, fructus submaturus, Y. H. He 118, 119, 120, 121, 122.

与正种区别在于芽大，长6—10(—15)毫米，粗3—5毫米；叶披针形或卵状披针形，较狭长，先端长渐尖，侧脉两边8—12，明显网结；花序2—3次分叉；果翅长5—10毫米，宽9—12毫米。

陕西：南郑、纸粉坝，1200米，1963. 7. 22日，王明昌 689；同地、青石关，770米，1963. 8. 5日，王明昌 728（模式标本！存西北林学院标本室）；同地，1300米，1985. 10. 8日，何云核 041, 042, 043, 045, 046；同地，1000—1200米，1986. 5. 13日、果近成熟，何云核 118, 119, 120, 121, 122。

巴山卫矛 新种 图版：8—10

Euonymus pashanensis S. Z. Qu et Y. H. He, sp. nov.

Species affinis *E. elegantissimo* Loes. et Rehd., sed gemmis ad 1 cm. elongatis; foliis ovato-lanceolatis vel lanceolatis; pedunculis brevioribus 3—6 cm. longis; capsularum alis brevissimis, 1—3 mm. longis et 5—8 mm. latis valde differt.

Frutex glaber; ramuli hornotini teretes pallide virides, vetustiores atro-sanguinei, laeves; gemmae conicae, 5—10 mm. longae, perulis viridibus

margine bruneo scarioso, lacero. Folia membranacea, ovato-lanceolata vel lanceolata, 3—8 cm. longa, 1—2 cm. lata, apice longe acuminata, basi cuneata vel sub-rotundata, dense serrulata dentibus minutis mucronatis, nervis utrinsecus 5—7 sub angulo acuto cirter 30—45° divergentibus, costa media et nervis utrinque prominulis, reticulo venularum obsoleto; petioli 3—5 mm. longi, supra conspicue canaliculati. Flores ignoti. Inflorescentia (fructifera tantum visa) semel usque bis furcata, pedunculo 3—6 cm. longo, pedicelli 1—1.5 cm. longi. Capsula 8—11 mm. diam. et alta, 4-alata, alis brevissimis, 1—3 mm. longis et 5—8 mm. latis, apice rotundatis; semina arillo aurantiaco inclusa.

Shaanxi, Ning-qiang, alt. 1420 m, in sylvia, 13 X 1963, S. Z. Qu 2948 (Typus! NWCF), id., alt. 1450 m., 11 V 1986, Y. H. He 112, 113.

灌木，光滑；当年生枝圆形，淡绿色，老枝深红色，平滑，芽圆锥形，长5—10毫米，芽鳞绿色，边缘干膜质，撕裂。叶膜质，卵状披针形或披针形，长3—8厘米，宽1—2厘米，顶端长渐尖，基部楔形或近圆形，细密小锯齿，齿端有小尖头，侧脉5—7以约30—45°的锐角开出，中脉和侧脉两面微隆起，网结不明显；叶柄长3—5毫米，上面有明显沟槽。花未见。花序（从果期看）1—2次分叉，总花梗长3—6厘米；花梗长1—1.5厘米。蒴果直径及高8—11毫米，具4翅，翅极短，长1—3毫米，宽5—8毫米，顶端圆钝；种子包于橙黄色假种皮中。

陕西：宁强，1420米，林中，1963. 10. 13日，曲式曾 2948（模式标本！存西北林学院标本室）；同地，1450米，1986. 5. 11日，何云核 112、113。

本种同长梗卫矛 *E. elegantissimus* Loes. et Rehd. 近缘，区别在于本种芽长达1厘米；叶卵状披针形或披针形；总花梗较短，长3—6厘米；蒴果翅极短，长1—3毫米，宽5—8毫米。



图版说明：1—3 毛脉卫矛 *Euonymus hamiltonianus* Wall. var. *pubinervius* S. Z. Q. et Y. H. He, var. nov. 1. 果枝×1 2. 果×2 3. 叶背面（局部）×5，示毛被
4—7 披针叶石枣子 *Euonymus sanguineus* Loes. var. *lanceolatus* S. Z. Qu et Y. H. He, var. nov. 4. 果枝×1 5. 果×2 6. 芽×3 7. 叶边缘（局部）×5，示锯齿
8—10 巴山卫矛 *Euonymus pashanensis* S. Z. Qu et Y. H. He, sp. nov.
8. 果枝×1 9. 果×2 10. 芽×3